


Wyniki ankiety¹


Jaka jest obecna postać Pana/i choroby?



17%

16% ankietowanych nie wie, jaką ma postać choroby, natomiast 1% uważa, że ma zespół klinicznie izolowany.


Pogarszanie się wydolności ruchowej (chodzenie) w ostatnich 12 miesiącach, niezależnie od rzutów choroby?



54%

respondentów odczuwa powolne pogorszenie się wydolności ruchowej (chodzenie) w ostatnich 12 miesiącach, niezależnie od rzutów choroby.

Zaburzenia funkcji poznawczych potencjalnie związane ze stwardnieniem rozsianym?




67%

pacjentów z SM odczuwa zaburzenie funkcji poznawczych.

¹ Raport „Optymalizacja opieki nad pacjentami z postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego (SPMS) w Polsce, Grudzień 2020, dostęp: www.konferencja-spms.pl/raport.pdf (konferencja-spms.pl)

Zaburzenia funkcji poznawczych

W ostatnim roku wykonywanie niektórych czynności zajmuje mi znacznie więcej czasu niż wcześniej:




62%

respondentów uważa, że wykonywanie niektórych czynności zajmuje im znacznie więcej czasu niż wcześniej.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Od jakiegoś czasu z trudem przychodzi mi dokładne przywołanie szczegółów rozmowy z inną osobą, np. omawianych faktów, dat, imion:




54%

ankietowanych uważa, że od jakiegoś czasu mają trudności z dokładnym przywoływaniem szczegółów rozmowy z inną osobą.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Od jakiegoś czasu sprawia mi trudność przypomnienie sobie pewnych ważnych sytuacji z mojego życia, które miały miejsce w przeszłości:




41%

pacjentów z SM zauważyło, że od jakiegoś czasu mają trudności z przypomnieniem sobie ważnych sytuacji mających miejsce w ich życiu w przeszłości.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Od jakiegoś czasu miewam problemy z rozpoznaniem osób, skąd daną osobę znam:




26%

chorych na SM zauważyło, że od jakiegoś czasu miewa problemy z rozpoznawaniem osób i kjarzeniem, skąd daną osobę zna.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Od jakiegoś czasu mam trudności z zapamiętywaniem informacji, żeby nie zapomnieć o danej rzeczy, muszę ją zanotować/zapisać:




63%

badanych uważa, że ma trudności z zapamiętywaniem informacji.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Nauka nowych rzeczy nie sprawia mi obecnie żadnego problemu:




49%

ankietowanych uważa, że nauka nowych rzeczy sprawia im trudności.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Od jakiegoś czasu mam trudności w szybkim wykonaniu czynności wymagającej skupienia, bardzo szybko się rozpraszam:




55%

pacjentów z SM uważa, że ma trudności z szybkim wykonywaniem czynności wymagających skupienia, ponieważ bardzo szybko się rozpraszają.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Od jakiegoś czasu często zdarza mi się odплыnąć myślami w trakcie rozmowy z inną osobą i stracić wątek:




44%

respondentów zauważyło, że zdarza im się odплыnąć myślami w trakcie rozmowy z inną osobą i stracić wątek.

Zaburzenia funkcji poznawczych

Z łatwością potrafię się wypowiedzieć w każdej sytuacji, zwykle nie brakuje mi słów:




47%

badanych uważa, że brakuje im słów i mają trudności z wypowiedzeniem się w pewnych sytuacjach.


Intensywność występowania zaburzeń poznawczych

Ile razy w ostatnim roku zdarzyło się Panu/i zauważyć u siebie narastające problemy związane z:


Zapamiętywaniem:




Wystawianiem się, znajdowaniem odpowiednich słów:




Skupieniem uwagi:




Rozkojarzeniem myśli w trakcie rozmowy:




Uczeniem się:



Rozróżnianiem kolorów/kształtów/rodzaju powierzchni:



Poprawa/ustępowanie wcześniej wymienionych problemów w wyniku leczenia/terapii




48%

uczestników badania uważa, że w wyniku leczenia/terapii problemy związane z funkcjami poznawczymi uległy poprawie.

Świadomość pacjentów na temat funkcji poznawczych

Czy Pana/i lekarz/pielęgniarka rozmawiał/a z Panem/nią na temat tzw. funkcjonowania poznawczego osób chorych na stwardnienie rozsiane?



70%

pacjentów nie miało rozmowy z lekarzem/pielęgniarką na temat tzw. funkcjonowania poznawczego osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Świadomość pacjentów na temat różnych postaci SM

76%

respondentów zadeklarowało, że słyszało o różnych postaciach SM.

23%


pacjentów słyszało o różnych postaciach SM, ale nie wiem, czym różnią się te postaci.

57%

badanych nie potrafiło poprawnie rozwinąć skrótu SPMS.

Pozyskiwanie informacji na temat postaci wtórnie postępującej SM od lekarza


Czy lekarz rozmawiał z Panem/ią o postaci wtórnie postępującej SM?



75%

pacjentów uważa, że lekarze podczas wizyt nie rozmawiali z nimi na temat postaci wtórnie postępującej SM.


Obawa przed utratą sprawności intelektualnej, fizycznej w wyniku długo trwającej choroby



49%

pacjentów boi się utraty niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej w takim samym stopniu.

Wpływ choroby na relacje z rodziną i bliskim otoczeniem




29%

ankietowanych zauważyło pogorszenie się ich relacji z rodziną i bliskimi.


Wpływ choroby na relacje z dalszym otoczeniem

np. sąsiedzi, współpracownicy, dalsi znajomi




34%
pacjentów zauważyło pogorszenie się ich relacji z dalszym otoczeniem.

Wpływ choroby na jakość życia



89%
uczestników badania uważa, że choroba w różnym stopniu wpłynęła na jakość ich życia.

Zaburzenia funkcji poznawczych potencjalnie związane ze stwardnieniem rozsianym?



Objawy wskazujące na przejście choroby z postaci RRMS w postaci SPMS




45%

pacjentów nie wie lub błędnie wskazuje objawy przejścia z postaci rzutowo-remisyjnej w postać wtórnie postępującą.

Leczenie a choroba

Czy po podjęciu terapii lekarz kiedykolwiek rozmawiał z Panią/em lub wspomniał o pojawiających się nowych lekach/nowych metodach leczenia?



53%

respondentów po podjęciu terapii nie otrzymało od lekarza informacji o pojawiających się nowych lekach/metodach leczenia.